

消化器内視鏡検査実施時の 休薬を必要とする抗血栓薬と休薬期間について

当院では、消化器内視鏡検査を安全に実施するため、血液を固まりにくくする薬（抗血栓薬）の一定期間の休薬をお願いしております。
一覧表をご覧ください、休薬が可能な[かかりつけ医](#)にご相談ください。

ジェネリック医薬品については一般名を参考にしてください。
また、一部のサプリメントも休薬の対象となりますのでご注意ください。

なお、受診者様によっては個別の対応を必要とする場合もあります。

判断に困られた場合は、検査前に、
[かかりつけ医](#)または、[当院（健診センター又は内科外来）](#)へ
お問い合わせください。

休薬期間については下表を参照ください。休薬期間は検査当日を含む日数となります。

例) 休薬期間が2日の場合は検査の前日から休薬

	一般名	主な商品名	その他の商品名	休薬期間
抗 血 小 板 薬	アスピリン	バファリンA81 バイアスピリン タケルダ	アスファネート バッサミン, ニトギス ファモター等	6日
	クロピドグレル	コンプラビン プラビックス		8日
	チクロピジン	パナルジン	マイトジン	8日
	プラスグレル	エフィエント		8日
	チカグレロル	ブリリント		8日

	一般名	主な商品名	その他の商品名	休薬期間
抗血小板薬	シロスタゾール	プレタール	コートリズム, シロシタミン シロスレット, プレトモール	3日
	イコサペント酸エチル	エパデール	エパキャップ エパラ, エパロース メルブラール	4日
	オメガ-3 脂肪酸エチル	ロトリガ		4日
	サルポグレラート	アンプラーグ		2日
	ベラプロスト	ドルナー ロサイリン		2日
その他	リマプロスト	オパールモン プロレナール		当日のみ
	トラピジル	ロコルナール		2日
	ジラセブ	コメリアン		2日
	ジピリダモール	ペルサンチン	ヨウリダモール	2日
	イフェンプロジル	セロクラール		2日
	イブジラスト	ケタス		2日
抗凝固薬	ワルファリン	ワーファリン		5日
	ダビガトラン	プラザキサ		2日
	リバーロキサバン	イグザレルト		2日
	エドキサバン	リクシアナ		2日
	アピキサバン	エリキューズ		2日

☆中日病院：休薬の対象のサプリメント

- ・EPA（エイコサペンタエン酸）
- ・DHA（ドコサヘキサエン酸）
- ・必須脂肪酸（オメガ3・6・9）
ex)CTDオメガシンなど

上記のサプリメントの休薬期間は4日間

※この他にも様々な名称でサプリが市販されています。